

SCANDONEST 3% **СКАНДОНЕСТ 3%**

Раствор для инъекций в картриджах

Состав на 1 картридж 1,8 мл

Мепивакаина гидрохлорид 54 мг

Хлористый натрий 0,80 мг

Раствор гидроксида натрия

Вода для инъекций

Фармакологические свойства

СКАНДОНЕСТ – это местноанестезирующий препарат быстрого действия, содержащий активный компонент амидного типа – Мепивакаина гидрохлорид. Его анестезирующие свойства основаны на торможении ионных потоков, ответственных за возникновение и проведение импульса на уровне нейронных мембран. Благодаря наличию вазоконстрикторного эффекта мепивакаина, нет необходимости в добавлении вазоконстрикторов при простых оперативных вмешательствах.

СКАНДОНЕСТ в картриджах не содержит консервантов.

Показания

Инфильтрационная и проводниковая анестезия при стоматологических вмешательствах. СКАНДОНЕСТ особенно показан для применения у пациентов, которым противопоказаны вазоконстрикторные препараты, особенно при лечении пациентов с заболеваниями сердечнососудистой системы (ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония и т. п.).

Противопоказания

Большие дозы СКАНДОНЕСТА не должны применяться или могут применяться лишь с исключительной осторожностью у пациентов с брадикардией, АВ-блоком, тяжелой степенью нарушения проводимости, сердечной декомпенсацией или тяжелой степенью гипотензии.

Особые указания

- Во время беременности местная анестезия считается наиболее безопасным методом для снятия боли при стоматологических вмешательствах.
- СКАНДОНЕСТ не влияет на течение беременности. Однако, как и при любой терапии, необходимо оценить степень пользы и риска лечения, особенно в первом триместре беременности.

Способ применения и дозы

- Для подслизистого введения.
- Скорость введения не должна превышать 0,5 мл за 15 секунд, т.е. 1 картридж в минуту. Во избежание случайного введения в вену, необходимо выполнить контроль аспирацией. Необходимо использовать наименьшие объемы, обеспечивающие анестезию. Если нет иных рекомендаций, назначают следующий режим дозирования:
- Для инфильтрационной и проводниковой анестезии обычно эффективная доза 1-4 мл.
- Доза, введенная взрослым в течение 2 часов, не должна превышать 6 мл, и соответственно 10 мл – за 24 часа.

Побочное действие

- Побочные эффекты могут возникнуть после передозировки, а также при случайном внесосудистом введении или при повышенной абсорбции, т.е. при резорбции из воспаленной или высоко васкуляризированной ткани, и характеризуется симптомами со стороны центральной нервной системы и/или сосудистой системы. Легкие проявления – головокружение, рвота, возбуждение; тяжелые проявления – сонливость, судороги, кома и паралич дыхания.
- Тяжелые проявления со стороны сосудистой системы характеризуются резким падением артериального давления, тахикардией или брадикардией, в дальнейшем переходящей в отдельных случаях в артериовентрикулярную блокаду.
- Аллергические реакции на СКАНДОНЕСТ отмечаются исключительно редко.

- При возникновении серьезных побочных реакций изначально необходимо поддерживать дыхательную функцию, по возможности с применением кислорода, необходим мониторинг пульса и артериального давления крови.
- При частых судорогах необходимо дополнительно ввести диазепам. В случае шока пациента необходимо уложить на спину, обеспечить снабжение кислородом и проводить внутривенную инфузионную терапию с применением противошоковых растворов.

Форма выпуска

Стеклянные картриджи по 1,8 мл, по 10 и 50 картриджей в одной картонной пачке.

Условия хранения

- Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света месте, недоступном для детей.
- Предохранять от замерзания
- После открытия картриджа рекомендуется незамедлительное использование содержимого.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

- Отпускается из аптек по рецепту врача.